

Listové hnojivo k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami. Formulace hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších živin a pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM směsi.

Složení

100 g/l Mg, tj. 166,6 g/l vodorozpustného MgO, 50 g/l N ve formě nitrátové NO₃, selektované huminové a fulvo kyseliny

Doporučené aplikace

Plodina	Dávkování SL [l/ha]	Termín aplikace	Počet aplikací
Obiloviny	1,0 - 2,0	Od počátku odnožování do metání	1 - 2
Brambory	1,0 - 2,0	Od 7 dnů po vzejití do konce kvetení	1 - 2
Cukrovka	1,0 - 2,0	Od 2 do 8 pravých listů	1 - 2
Řepka	1,0 - 2,0	Od 4 do 8 pravých listů, v období prodlužovacího růstu	2
Kukuřice	1,0 - 2,0	Od 2 do 8 pravých listů	1 - 2
Slunečnice	1,0 - 2,0	Od 2 do 8 pravých listů	1 - 2
Ostatní	1,0 - 2,0	Vždy při zjištění deficitu hořčíku, v závislosti na jeho hloubce	1 - 3

