

## 2.2.13 FOLIT® Ca 260 SL Hnojiva ES

Listové koncentrované hnojivo s obsahem vodorozpustného vápníku a s přidavkem důležitých mikroživin ve formě kapalného koncentrátu, určené zejména k pokrytí zvýšených nároků na příjem vápníku

ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

### Složení

185 g/l Ca, tj. 260 g/l vodorozpustného CaO, 150 g/l vodorozpustného N ve formě N-NO<sub>3</sub> (dusičnanový), dále vodorozpustný B, Cu, Zn, Mo v chelátových EDTA vazbách

### Doporučené aplikace - výtah z etikety

Plodina	Dávkování SL [l/ha]	Termín aplikace	Počet aplikací
Jabloně	4,0 - 6,0	Po odkvětu až do 2 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů	3 - 7
Hrušně	2,0 - 4,0	4 až 6 týdnů po odkvětu a dále v intervalu cca 14 dnů	2 - 4
Višně, třešně, jahodník	3,0 - 5,0	7 až 10 dnů po odkvětu a dále v intervalu cca 14 dnů	3 - 4
Broskvoně, meruňky, švestky	3,0 - 5,0	Od počátku růstu plodů až do 2 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů	3 - 5
Rajčata, papriky, okurky	1,0 - 3,0*	2 až 3 týdny po výsadbě a dále v intervalu cca 14 dnů	3 - 4
Kořenová a cibulová zelenina	2,0 - 4,0	2 až 3 týdny po výsadbě nebo vzejití a dále v intervalu cca 14 dnů	1 - 3
Luskoviny	2,0 - 4,0	2 až 3 týdny po vzejití a dále v intervalu cca 14 dnů	1 - 2
Salát	1,0 - 2,0*	Od vytvoření listové růžice do cca 14 dnů před sklizní	2 - 3
Polní plodiny	1,5	V průběhu intenzivního růstu	2 - 3
Ostatní	2,0 - 5,0	Vždy při zjištění deficitu vápníku, v závislosti na jeho hloubce	1 - 4

\* Ve sklenících a fóliovnících použijte spodní hranici dávkování.