

2.2.9 FOLIT® Bór 150 SL Hnojiva ES

Listové hnojivo s obsahem bóru ve formě kapalného koncentrátu určené k odstranění deficitu bóru v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem bóru některými plodinami, zejména řepkou olejkou, mákem

a dalšími olejnami, cukrovkou, ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

Složení

150 g/l vodorozpustný bór jako boretanolamin

Doporučené aplikace

Plodina	Dávkování SL [l/ha]	Termín aplikace	Počet aplikací
Ovocné dřeviny	1,0 - 2,0	Od otvírání pupenů do květu, po sklizni	1 - 3
Zelenina	0,3 - 0,8	4 týdny až 8 týdnů po výsadbě	1 - 2
Řepka ozimá	0,8 - 1,6	Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)	1 - 3
Obiloviny ozimé	0,1 - 0,6	Od konce odnožování do počátku metání (DC 29-41)	1
Cukrovka	0,8 - 1,6	Po dokončení tvorby listové růžice	2
Mák	0,6 - 1,2	Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)	1 - 2
Réva vinná	1,0 - 2,0	Od otvírání pupenů až 4. týdny po odkvětu	1 - 3
Slunečnice	0,6 - 1,2	Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)	1 - 2
Ostatní	0,2 - 0,6	Vždy při zjištění deficitu bóru, v závislosti na jeho hloubce	1 - 2

